

Рекомендуемый режим инкубации куриных яиц (от 500шт)

День инкубации	Температура воздуха	Влажность воздуха	Температура скорлупы	Проветривание	Охлаждение	Примечание
1	38.0	60%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
2	38.0	60%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
3	38.0	60%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
4	37.8	55%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
5	37.8	55%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
6	37.7	55%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
7	37.7	55%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
8	37.7	50%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
9	37.7	50%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
10	37.7	50%	37,7-37,9	30сек в 30 мин		
11	37.6	50%	38.0-38,2	30сек в 20 мин	2 раза в день 20 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
12	37.6	50%	38.0-38,2	30сек в 20 мин	2 раза в день 20 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
13	37.5	50%	38.0-38,2	30сек в 15мин	2 раза в день 30 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
14	37.4	45%	38.0-38,2	30сек в 15мин	2 раза в день 30 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
15	37.3	45%	38,3-38,5	30сек в 15мин	2 раза в день 30 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
16	37.3	43%	38,3-38,5	30сек в 15мин	2 раза в день 40 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
17	37.2	43%	38,3-38,5	30сек в 15мин	2 раза в день 40 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
18	37.2	42%	38,3-38,5	30сек в 15мин	2 раза в день 50 минут	Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С
19	37.0	65%		30сек в 10мин	2 раза в день 40 минут	ВЫВОДНОЙ РЕЖИМ
20	36.8	70%		30сек в 10мин	2 раза в день 40 минут	
21	37.0	70%		30сек в 10мин	2 раза в день 40 минут	

После 11 дня инкубации важна температура на скорлупе яйца, температуру воздуха необходимо корректировать таким образом чтобы температура скорлупы не превышала значения 38.3-38.5С. Соответственно температура воздуха внутри инкубатора может отличаться от приведенных выше значений, в зависимости от типа инкубатора, его конструктивных особенностей и количества инкубируемых яиц. Охлаждение яиц после 16 дня, так же лучше производить исходя из температуры скорлупы яйца (32-33С), время охлаждения может отличаться от приведенного в табл. так как зависит от температуры воздуха в помещении где стоит инкубатор.